


Paludismo: diagnóstico y tratamiento



Tratamiento de las infecciones por *Plasmodium vivax*, *malariae* y *ovale* sensibles a la cloroquina

Fuente: WHO. Guidelines for the treatment of Malaria. Third edition. World Health Organization, 2015

Droga	Pacientes	Dosis
Cloroquina	Niños y adultos	25 mg/kg dosis total repartidos de la siguiente forma: Dosis inicial: 10 mg/kg 1 ^{er} día Segunda dosis: 10 mg/kg/ 2 ^o día Dosis subsiguiente: 5mg/kg 3 ^{er} día
Primaquina*	Niños y Adultos	0,25 mg/kg/día VO por 14 días

*En poblaciones con déficit de G6PDH, la dosis es de 0,75 mg/kg 1 vez x semana durante 8 semanas.
NO se debe administrar primaquina a embarazadas, menores de seis meses o mujeres que amamantan bebés menores de 6 meses.

- Embarazadas, niños < 6 meses o mujeres en lactancia a niños < de 6 meses recibirán profilaxis semanal con cloroquina (5 mg de cloroquina base/kg o 300 mg o 2 tabletas de 150 mg (adultos) hasta que el embarazo o lactancia termine o el niño tenga más de 6 meses. Entonces, si no hay deficiencia de G6PDH administrar primaquina por 14 días
- Las infecciones por *P. malariae* no requieren primaquina.**