





### VIGILANCIA DE VIRUS RESPIRATORIOS

Hasta SE 27, se han estudiado 1.126 muestras para virus respiratorios, con 385 casos positivos (porcentaje de positividad del 34,19%), considerando pacientes ambulatorios e internados de sector público.



Fuente: Dirección Provincial de Sanidad en base a datos del SNVS2.0

Del total de casos positivos, la mayor proporción corresponde al Virus Sincicial Respiratorio (79,48%), seguido del Virus H3N2 (13,25%). En estas últimas semanas, se observó el incremento del VSR.




Fuente: Dirección Provincial de Sanidad en base a datos del SNVS2.0





A continuación, se muestra la distribución de casos por Grupo Etario.

**Distribucion de casos de Virus Sincicial Respiratorio por Grupo Etario.  
Año 2022. Jujuy. N=306**



Fuente: Dirección Provincial de Sanidad en base a datos del SNVS2.0

### Recomendaciones:

- Realizar vigilancia intensificada de febriles y enfermedad respiratoria, incluyendo magnitud, gravedad y virus circulantes.
- Vacunación a población objetivo.
- Manejo clínico adecuado de pacientes según normas.
- Implementación de medidas de control de infecciones en los servicios de atención de salud.
- Comunicación a la población sobre las medidas de prevención.
- Realizar Notificación oportuna (a semana concluida) y regular (todas las semanas continuas).
- Aplicar la Guía de vigilancia epidemiológica, recomendaciones para la prevención, diagnóstico y atención de IRA.
- Realizar análisis local de situación de salud.
- Reorganizar sus servicios en función de la información disponible y la situación epidemiológica.

Toda la información contenida en este Parte de Salud es parcial, dinámica y sujeta a modificaciones.

